PRODUKTINFORMATION

FINKTEC®
Professional Hygiene Management

Stand 12/2022

FINK – Oxi Dip® A
FINK – Oxi Dip® B

2 Komponenten Zitzendesinfektionsmittel zum Dippen

Art.-Nr. 18231 - FINK - Oxi Dip® A **BAuA-Nr. N-104450**
Art.-Nr. 18232 - FINK - Oxi Dip® B **BAuA-Nr. N-104451**

Produktbeschreibung

FINK - Oxi Dip® ist ein 2 Komponenten Dipmittel auf Chlordioxidbasis zur Zitzendesinfektion und -pflege bei Kühen, Ziegen und Schafen nach dem Melken. Die abgestimmte Wirkstoffkombination verhindert ein Austrocknen der Zitzenhaut, pflegt beanspruchte, gereizte Haut und schützt den Strichkanal zwischen den einzelnen Melkzeiten.

Produkteigenschaften

- Zur Euterpflege nach dem Melken
- Bildet einen pflegenden Schutzfilm
- Hält die Zitze glatt und geschmeidig
- Basis: Chlordioxid

- **Nur für den professionellen Anwender**

Produktdaten

FINK - Oxi Dip® ist ein **2 Komponenten System** bestehend aus: **FINK - Oxi Dip® A** und **FINK - Oxi Dip® B**. Durch das Vermischen im Verhältnis 1:1 entsteht das gebrauchsfertige **FINK - Oxi Dip®.**

Chemisch physikalische Daten:

FINK - Oxi Dip® A

Form, Farbe	Orangene Flüssigkeit
Dichte	1,02 - 1,03 (g/cm³ bei 20 °C)
pH-Wert	2,2 - 3,0 (100 % bei 20 °C)

FINK - Oxi Dip® B

Form, Farbe	Opake, weißlich bis hellgelbe Flüssigkeit
Dichte	1,02 - 1,03 (g/cm³ bei 20 °C)
pH-Wert	11,0 - 12,0 (100 % bei 20 °C)

FINK - Oxi Dip®

Form, Farbe	Orangene Flüssigkeit
Geruch	Charakteristisch

Zusammensetzung:

Filmbildner, Verdicker, Chlordioxid und Pflegemittel

Mikrobiologische Wirksamkeit

Geprüfte Wirksamkeit		Konz.	Einwirkzeit	Temperatur
Bakterizid	EN 1656	100 %	5 min.	30 °C
Levurozid	EN 1657	100 %	5 min.	30 °C

Anwendungsempfehlung

FINK - Oxi Dip® wird wie folgt angewendet:
Beide Komponenten in einem sauberen Behälter im Verhältnis 1:1 zusammengeben und intensiv mischen bis sich eine einheitlich orangene Farbe einstellt. Die so hergestellte Mischung ist nach einer Reaktionszeit von 15 Minuten einsatzbereit und kann über die Dauer einer Melkzeit verwendet werden. Die Mischung ist vor jeder Melkzeit neu anzumischen, da der Wirkstoff (Chlordioxid) zerfällt.

Konzentration	100 % der Mischung
Temperatur	30 °C
Technologie	Dippen nach dem Melken

Die Zitzen sind während der gesamten Laktationsperiode unmittelbar nach dem Melken mit **FINK - Oxi Dip®** zu dippen. Bei trockenstehenden Kühen sollte **FINK - Oxi Dip®** einmal täglich angewendet werden.

Lagerung / Entsorgung

FINK - Oxi Dip® A und **FINK - Oxi Dip® B** sind frostempfindlich ab -5 °C. Kühl und trocken lagern. Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften zuführen.

Ökologische Bewertung

FINK - Oxi Dip® A und **FINK - Oxi Dip® B** entsprechenden Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes. Die organischen Bestandteile der Zubereitung sind biologisch abbaubar.

Besondere Hinweise
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt lesen und alle Anweisungen befolgen.

Das Produkt ist ausschließlich für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt. Die Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Der Inhalt stellt keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften dar und befreit den Anwender wegen der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen.

FINK TEC GmbH
Oberster Kamp 23, D-59069 Hamm
T +49 (0) 2385/73-0, F +49 (0) 2385/73-349
info@finktec.com, www.finktec.de